

Letalidade de Leishmaniose Visceral. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 2000 a 2013

Região e UF	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Região Norte	2,7	2,3	5,4	6,9	7,4	5,6	5,0	3,9	5,0	2,4	5,7	4,4	3,5	5,4
Rondônia	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roraima	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	50,0	0,0	13,3	10,0	20,0	0,0
Pará	4,1	2,9	5,2	5,8	5,1	5,5	5,1	3,9	4,0	2,9	2,9	4,2	0,8	5,2
Amapá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Tocantins	1,6	1,3	5,9	8,0	13,0	5,7	4,9	4,0	5,8	2,1	7,6	4,5	5,1	6,0
Região Nordeste	3,2	6,5	7,2	7,8	6,3	6,9	7,3	5,7	5,4	4,9	5,1	7,0	7,2	5,5
Maranhão	2,4	3,3	6,5	6,6	5,7	6,5	8,4	5,7	3,8	3,8	3,8	6,8	5,4	5,0
Piauí	2,2	6,7	5,5	9,1	6,0	5,9	6,6	6,7	7,5	9,6	7,9	7,4	3,4	4,7
Ceará	0,8	5,6	5,9	8,5	7,4	5,1	6,7	4,0	5,7	4,3	4,1	8,5	8,9	6,1
Rio Grande do Norte	5,4	4,1	5,9	6,5	3,6	4,2	1,4	1,8	6,9	4,8	6,0	4,1	8,4	3,1
Paraíba	4,6	2,1	15,0	6,5	3,6	16,1	5,6	4,3	3,7	12,5	13,0	13,3	11,1	0,0
Pernambuco	3,5	8,8	10,5	11,4	10,6	11,0	10,4	14,3	6,8	8,1	14,0	5,3	7,3	10,9
Alagoas	6,7	5,1	5,2	8,2	5,3	5,3	2,0	10,3	7,7	0,0	5,9	5,6	13,8	8,0
Sergipe	4,2	19,5	16,7	15,8	3,1	11,9	8,5	8,1	3,1	0,0	5,3	13,6	10,0	4,5
Bahia	3,1	12,5	9,1	7,9	6,8	8,0	8,2	5,9	5,8	4,0	4,7	4,2	7,9	6,5
Região Sudeste	2,9	9,2	9,4	11,0	12,8	10,5	7,4	6,8	5,7	11,7	9,2	8,8	8,8	10,4
Minas Gerais	2,8	13,1	7,0	9,2	12,4	9,9	8,6	6,5	6,4	13,6	10,4	8,7	10,0	11,7
Espírito Santo	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Rio de Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	11,1	0,0	0,0	33,3	0,0	1,0	1,0	1,0
São Paulo	3,4	3,6	14,4	15,1	13,5	12,1	5,3	7,4	4,0	5,9	5,1	9,2	6,2	8,1
Região Sul	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paraná	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santa Catarina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rio Grande do Sul	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Região Centro-Oeste	6,0	13,0	10,0	12,1	9,7	12,6	10,8	5,9	10,2	7,3	6,9	6,4	7,9	11,9
Mato Grosso do Sul	6,1	14,9	9,1	12,1	8,2	10,8	9,1	4,1	11,7	5,8	8,0	5,6	7,3	10,2
Mato Grosso	4,3	5,6	37,5	7,7	15,0	22,7	14,3	20,0	9,8	7,5	7,4	14,0	5,4	15,2
Goiás	4,5	11,1	5,9	14,3	10,7	23,1	15,6	5,0	0,0	13,3	0,0	0,0	18,2	18,5
Distrito Federal	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Brasil	3,2	6,6	7,6	8,5	8,2	7,8	7,2	5,5	5,6	5,8	6,2	6,7	7,1	7,1

Fonte: Sinan/SVS/MS

Até 2006 os óbitos referem-se a UF de residência, a partir de 2007 foram considerados óbitos segundo UF Fonte de Infecção.